



作物名	適用病害虫名	希釈倍数 又は 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	銅 を含む 農薬の 総使用回数
アスパラガス	斑点病 茎枯病	500倍	100～300 Q/10a	—	—	散布	—
	茎枯病	8倍	8Q/10a			無人ヘリコプター による散布	
にがうり	うどんこ病	500倍	100～300 Q/10a				
かぼちゃ	果実斑点細菌病 軟腐細菌病						
ズッキーニ	軟腐細菌病						
くわい	ひぶくれ病						
さんしょう (果実)	さび病	1000倍	200～700 Q/10a				
さんしょう (葉)							
野菜類	斑点細菌病 褐斑細菌病 黒腐病 軟腐病 べと病 黒斑細菌病	500倍	100～300 Q/10a				
こんにゃく	葉枯病 腐敗病	500～800倍	200～400 Q/10a				
てんさい	褐斑病	400倍					
茶	炭疽病	500倍				200～400 Q/10a	
	赤焼病		400～500倍				
りんどう	もち病 網もち病	500倍	100～300 Q/10a				
つつじ類	もち病						
樹木類	斑点症 (シュート・サウスポウ菌)	800倍	100～700 Q/10a				
	輪紋葉枯病	500倍		発病初期			