


みかん・かんきつの害虫対策に 果樹用殺虫剤

ダーズパン™ 乳剤40

みかんとかんきつの
害虫防除に。



ダーズパンは、かんきつの重要害虫である

ヤノネカイガラムシ、コナカイガラムシ類、ハマキムシ類などに

優れた速効性と安定した効果を発揮します。

防除体系に上手に組み入れて、

効率的で経済的な害虫防除にお役立てください。



ダーズパンTM 乳剤40

登録番号:第14129号

有効成分:クロルビリホス…40.0%

性 状:淡黄色透明可乳化油状液体

人畜毒性:医薬用外劇物

●ダーズパン乳剤40の主な特長

**1.みかん・かんきつの幅広い
害虫に安定した効果**

**2.接触毒および食毒により、
速効的な効果を發揮**

**3.散布コストが安く、
経済的な防除が可能**

●適用害虫と使用方法(抜粋)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	10アールあたりの 使用液量(ℓ)	使用時期	使用方法	使用回数*
みかん (露地栽培)	ハマキムシ類、アブラムシ類	1,500	200~700	収穫30日前まで	散布	2回以内
	ヤノネカイガラムシ若齢幼虫、 コナカイガラムシ類、 クワゴマダラヒトリ幼虫	1,000				
	カミキリムシ類幼虫	100	20~70		樹幹散布	
かんきつ (みかんを除く)	ハマキムシ類、ア布拉ムシ類	1,500	200~700	収穫60日前まで	散布	1回
	ヤノネカイガラムシ若齢幼虫、 コナカイガラムシ類、 クワゴマダラヒトリ幼虫	1,000				

※本剤およびクロルビリホスを含む農薬の総使用回数 ◎本資料は2009年8月現在の知見に基づき作成されています。*上記作物の他に、茶、たまねぎ、ばれいしょ、だいす、てんさいにも登録があります。

●試験成績

ヤノネカイガラムシに対する効果


和歌山県果樹園芸試験場 1972年



品種:温州(鉢植) 発生:多発 散布月日:6月17日 調査月日:7月8日

フジコナカイガラムシに対する効果

静岡県柑橘試験場 1983年



方法:9月17日薬液内に本虫に寄生した果実を浸漬処理し、48時間後に寄生虫を生死別に調査

△ 使用上の注意

- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性薬剤とは混用しないでください。
- ヤノネカイガラムシに対しては、発育が進むと効果が落ちるので若齢幼虫期に散布してください。
- かんきつに対し、施設内で使用すると薬害の恐れがあるので、施設内の散布はしないでください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかかるないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下の事に注意してください。
- ミツバチの巣箱及びその周辺にかかるようにしてください。
- 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では、使用を避けてください。
- 養蜂が行われている地区では、周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 本剤は、自動車などに散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかかるよう注意してください。

▲ 安全使用上の注意



- 医薬用外劇物ですので取扱いには十分注意してください。
- 誤って飲み込んだ場合には、吐かせないで直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使

用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。

- 本剤の解毒剤としては、硫酸アトロピン製剤が有効であると報告されています。
- 原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用し、薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には、直ちに石けんでよく洗い落してください。
- 散布の際は、防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他の物とは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(魚類・甲殻類)に強い影響を及ぼす恐れがあるので、河川・湖沼・海域及び養殖池に本剤が飛散・流入する恐れのある場所では使用しないでください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。散布器具・容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また空容器、空袋等は水産動物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 危険物第四類第二石油類に属するので、火気には十分注意してください。
- 火気を避け、直射日光が当たらない鍵のかかる低温な場所に密栓して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
●空容器は圃場等に放置せず、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

製造 ダウ・ケミカル日本株式会社
販売 ダウ・アグロサイエンス事業部門

本社／〒140-8617 東京都品川区東品川2丁目2番24号
天王洲セントラルタワー <http://www.dowagro.com/jp>
支店／北日本(盛岡)・東京・中日本(大阪)・福岡 営業所／札幌・名古屋

取扱