

# 今夏のダニ防除はこれだ!



ダニの攻めを断つ、名リリース。

## ダニカット<sup>®</sup> 乳剤20

[有効成分:アミトラス……20.0% 普通物]

- ミカンハダニ成虫・若虫・幼虫・卵にシャープな効きめ。
- サビダニ、ロウムシ類(幼虫)も併殺防除。

### ダニ防除の基本は3T散布で

#### 1T 適期散布

夏ダニ(6~9月)の発生初期に早めに散布してください。

#### 2T 適量散布

10アール当り500ℓ(成木)以上たっぷり散布してください。

#### 3T ていねい散布

散布むらのないように、葉裏までていねいに散布してください。

- 抵抗性の発現を回避するため、本剤の使用は年1回とし、他のダニ剤とのローテーションでご使用ください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液などアルカリ性薬剤との混用は避けてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

### 適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤及びアミトラスを含む農薬の総使用回数	使用方法
かんきつ	ミカンハダニ ミカンサビダニ	1,000~ 1,500倍	みかん 収穫14日前まで	1回	散布
	ロウムシ類 (幼虫)	1,000倍	かんきつ (みかんを除く) 収穫45日前まで		

取扱い



**日産化学工業株式会社**

本社 東京都千代田区神田錦町3-7-1  
札幌・仙台・東京・名古屋・(北陸)・大阪・福岡