


幅広い作物に適用、 あなたの畑の 登録農薬です。



オルトラン[®] 水和剤

30年の実績と信頼

- 1 広範囲の害虫に高い効果を示します。
- 2 幅広い作物に適用があります。
- 3 有効成分は優れた浸透移行性をもち作物全体に広がります。
- 4 長期間にわたり害虫の発生を抑えます。
- 5 オルトラン粒剤との体系防除が可能です。
(詳しくは各薬剤の製品ラベルをご覧ください)

ヨトウムシ、アオムシ、コナガ等の食害性害虫から、アブラムシ、スリップス等の吸汁性害虫まで、広範囲の害虫に高い効果を示します。



オトラン®水和剤 適用害虫と使用方法

農林水産省登録 第19992号

作物名	適用病虫害名	希釈倍数(倍)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
なす	アブラムシ類、アザミウマ類	1000~2000	収穫7日前まで			
	ハスモンヨトウ、オオタバコガ	1000				
キャベツ	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ タマナギシウバ	1000~1500	収穫14日前まで	3回以内		3回以内
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1000~2000				
はくさい	カブラハバチ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ	1000~1500	収穫14日前まで	3回以内		3回以内
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1000~2000				
レタス	ヨトウムシ	1000~1500	収穫21日前まで			
	オオタバコガ	1000				
非結球レタス	ヨトウムシ	1000~1500	収穫21日前まで			
	オオタバコガ	1000				
ブロッコリー カリフラワー	ヨトウムシ	1000	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内 (は種前及びは種時の 処理は合計1回以内)
だいこん	ヨトウムシ、カブラハバチ ダイコンシンクイムシ	1500				
はつかだいこん	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1500~2000	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内 (は種前の処理は 1回以内)
	ヨトウムシ、カブラハバチ ダイコンシンクイムシ	1500				
非結球あぶらな 科葉菜類 (ケール、からしな、 みずな、 ルッコラを除く)	アブラムシ類	1500	収穫21日前まで	1回		1回
かぶ	アオムシ コナガ					
葉しょうが しょうが	アワノメイガ			2回以内		2回以内
ごぼう	アブラムシ類	1000	収穫45日前まで	1回		2回以内 (株元散布は1回以内、 散布は1回以内)
オクラ	アブラムシ類、ミドリヨコバイ テントウムシタマシ幼虫、ヨトウムシ		収穫7日前まで	4回以内		1回
ばれいしょ	アブラムシ類、ジャガイモガ	1000~1500				
	アブラムシ類	300			10a当り25g散布	5回以内 (種付時の処理は1回 以内、種付後は4回以内)
てんさい	ヨトウムシ、テンサイモグリハナバエ トビハムシ類	1000~1500	収穫45日前まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗期の灌注は1回 以内、散布は3回以内)
	ヨトウムシ	1000				
	ヨトウムシ	16			10a当り1.6g 無人ヘリコプター散布	
	トビハムシ類	60~100	育苗期	1回	10a当り25g散布	
トマト	アブラムシ類	1000~2000	収穫前日まで	3回以内	1m ² 当り2.5~3g灌注	3回以内
ミニトマト	アブラムシ類	1500	収穫14日前まで	1回		2回以内 (定植時の灌注は1回以内、 定植後は1回以内)
とうもろこし			収穫7日前まで	2回以内		2回以内
あずき	フキノメイガ、アブラムシ類、ヨトウムシ	1000	収穫14日前まで	3回以内		3回以内
やまのいも	ヤマノイモガ		収穫45日前まで	1回		1回
だいず	ハスモンヨトウ、マメシンクイガ、アブラムシ類	16	収穫60日前まで	3回以内	10a当り1.6g 無人ヘリコプター散布	3回以内
	アブラムシ類					
えだまめ	ハスモンヨトウ、アブラムシ類	1000	収穫21日前まで			
いんげんまめ	アブラムシ類	1000~1500	収穫14日前まで		散布	
たまねぎ	ネギアザミウマ	300	収穫21日前まで	5回以内	10a当り25g散布	5回以内
		16				
にんにく	ネギコガ、アブラムシ類	1000	収穫7日前まで		10a当り1.6g 無人ヘリコプター散布	
ぶどう	チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ ハマキムシ類	1500~2000	収穫30日前まで	2回以内		2回以内
かき	カキクダアザミウマ、チャノキイロアザミウマ カキノヘタムシガ	1000~1500	収穫45日前まで			
	カキノヒメヨコバイ、フジコナカイガラムシ					
かんきつ	コカクモンハマキ、シャクトリムシ類 ヤブネカイガラムシ第1世代、ツノロウムシ ルビーロウムシ、ミカンキイロアザミウマ ネギアザミウマ、ゴボウノミドリヒメヨコバイ	1000	収穫30日前まで	3回以内		3回以内
	アブラムシ類、ケシキスイ類 コアオハナムグリ、アザミウマ類	1000~1500				
	ミカンゴケコナジラミ	1500~2000				
いちじく	アザミウマ類	2000	収穫45日前まで	1回		1回
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ	1000~2000	摘採30日前まで	2回以内		2回以内
さんしょう(果実)	チャノコカクモンハマキ	1000~1500	収穫14日前まで	1回		1回
	チャノキイロアザミウマ	1500				
だいおう	ヨトウムシ	1000	生育期 但し、収穫230日前まで	3回以内		3回以内
みしまさいご 薬用いんじん	アブラムシ類	1500	収穫30日前まで	5回以内	散布	5回以内
ソルガム		1000	収穫180日前まで	3回以内		
			収穫30日前まで	3回以内		3回以内
たばこ	ヨトウムシ、タバコアオムシ、アブラムシ類	1500~2500	収穫10日前まで	2回以内		2回以内
	ヤサシウムシ	1000~2000				
	ジャガイモガ若齢幼虫 ジャガイモガ中齢幼虫	1500~2000	苗床期			
つつじ類	ツツジグンバイ	1500				
つばき類	チャドクガ					
さくら	モンクロシャチホコ	1000~1500				
	アメリカシロヒトリ	1500~2000				
花き類・ 観葉植物	アザミウマ類、アブラムシ類	1000~1500				
きく	アオムシ、ヨトウムシ類					
ストック	マメハモグリバエ、オオタバコガ		発生初期	5回以内		5回以内
宿根アスター	コナガ、ハイマダラノメイガ					
オンシジウム	ヨメナスジハモグリバエ					
カーネーション	カイガラムシ類					
ひまわり	コナガ					
斑入りアマドコロ リアトリス	タバコガ					
樹木類	ハマキムシ類	1000				
グラジオラス	アザミウマ類		種付時	1回	10分間球根浸漬	
芝	シバツトガ、タマナヤガ		発生初期	5回以内		1m ² 当り0.25~2g散布
	スジキリヨトウ、ケラ					
	シバオサソウムシ成虫				1m ² 当り1~2g散布	
	アカフツツリガ				1m ² 当り2g散布	
もりあざみ		1500	収穫45日前まで	1回	1m ² 当り0.5~1g散布	1回
まめ科牧草	アブラムシ類	1000		3回以内	散布	3回以内

2008年10月1日現在の登録内容

農薬は正しく使しましょう 1.使用前にはラベルをよく読んでください。2.ラベルの記載以外には使用しないでください。3.本剤は小児の手の届く所には置かないでください。4.空袋は正しく処分してください。5.防除日誌を記載しましょう。

●適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に葉害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病虫害防除所等関連機関の指導を受けることが望まれます。

アリスライフサイエンス株式会社
〒104-6591 東京都中央区明石町8-1
TEL 03-3547-4416 FAX 03-3547-4695
http://www.agrofrontier.com