

明日の
農業を
考える

適用拡大

(なし、おうとう、ぶどう)



ミカンサビダニ
による被害果



チャノホコリダニ
による被害果



ヤノネカイガラムシ



フジコナカイガラムシ



アカマルカイガラムシ



(写真はイメージです)

みかん・かんきつの
サビダニ・ホコリダニ・カイガラムシ防除に

アプロードエース[®]

プロアブル



タバココナジラミ

トマト・なす・きゅうりの
コナジラミ類にも
登録があります。



©は日本農業株式会社の登録商標です。

農林水産省登録
第20106号

アプロードエース フロアブル

有効成分：プロロフェジン……………20.0%
フェンピロキシメート……………4.0%

毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)

特長

安定した効果

本剤はプロロフェジンとフェンピロキシメートの混合剤です。それぞれの有効成分がミカンサビダニ・チャノホコリダニおよびヤノネカイガラムシに補完的に作用するため、安定した効果が期待できます。また効果持続性にも優れます。

高い選択性



限られた害虫種にのみ殺虫活性が高く、有用昆虫・天敵に影響が少ないため、IPM(総合的病害虫・雑草管理)に適した薬剤です。

適用病害虫および使用方法

(2018年9月現在の登録内容)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェンピロキシメートを含む農薬の総使用回数	プロロフェジンを含む農薬の総使用回数		
みかん	カイガラムシ類	1000倍	200~700ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内	3回以内		
	ミカンサビダニ	1000~2000倍								
	チャノホコリダニ	2000倍								
かんきつ(みかんを除く)	カイガラムシ類	1000倍		収穫45日前まで	2回以内		2回以内	2回以内	2回以内	
	ミカンサビダニ	1000~2000倍								
	チャノホコリダニ	2000倍								
なし	カイガラムシ類、ニセナシサビダニ	1000倍	200~700ℓ/10a	収穫30日前まで	1回	1回	2回以内	3回以内		
もも	収穫14日前まで									
うめ おうとう ネクタリン	カイガラムシ類			1000倍	200~700ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
						収穫30日前まで				
						ぶどう	収穫14日前まで			
いちじく	カイガラムシ類、キウイヒメヨコバイ			1000倍	200~700ℓ/10a	1回	2回以内	1回	2回以内	2回以内
キウイフルーツ										
とうがらし類	コナジラミ類	1000~2000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	3回以内		
トマト	トマトサビダニ									
なす	コナジラミ類									
	チャノホコリダニ									
きゅうり	コナジラミ類								1000~2000倍	
すいか	コナジラミ類								1000~2000倍	100~300ℓ/10a
メロン										
茶	カイガラムシ類	1000倍	200~400ℓ/10a	摘採14日前まで	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内		
	チャノミドリヒメヨコバイ									
	チャノホンガ、チャノホコリダニ チャノナガサビダニ、チャトゲコナジラミ									
ポインセチア ガーベラ	コナジラミ類	1000~2000倍	100~300ℓ/10a	発生初期	6回以内	6回以内	6回以内	6回以内		

試験成績(かんきつ)



使用上の注意事項

- 散布適期は、幼虫が量占する時期であり、多発時および成虫が多い時期には直ちに密度を低下させることができないので、殺成虫効果があり速効性の薬剤と組み合わせて使用することが望ましいです。
- なしの萌芽期から新梢伸長期に使用する場合、薬液が乾きにくい条件下では、葉に褐色斑点等の葉害が生じるおそれがあるので、注意して使用してください。但し、施設栽培ではこの時期での使用をさけてください。
- 薬に長期毒性があるので、桑葉にからまないように注意してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめ使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の処置を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の処置を受けさせてください。

- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の処置を受けてください。
- 皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすしてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗顔してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼および海等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養魚池周辺での使用はさけてください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養魚池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。 ●使用後の空容器等は園場などに設置せず、適切に処理してください。



日本農薬株式会社
東京都中央区京橋1丁目19番8号
カスタマーサービス TEL. 03-6361-1414
ホームページアドレス <https://www.nichino.co.jp/>
2018年4月作成版(Z)B211809S