

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 22345 号 登 録 年 月 日 平成 27 年 2 月 18 日

登 録 の 有 効 期 間 平成 30 年 2 月 17 日

農 薬 の 種 類 マンゼブ水和剤

農 薬 の 名 称 ジマンダイセン水和剤

物 理 的 化 学 的 性 状 淡黄色水和性粉末 45 μ m以下

有 効 成 分 の 種 類 及 び 含 有 量 亜鉛イオン配位マンガン・ニズ・エチレンビスジチオカーバメート 80.0%

そ の 他 の 成 分 の 種 類 及 び 含 有 量 界面活性剤等 20.0%

適 用 病 害 虫 の 範 囲 及 び 使 用 方 法 (別記のとおり)

製 造 者 又 は 輸 入 者 の 氏 名 及 び 住 所 東京都品川区東品川二丁目2番24号
ダウ・ケミカル日本株式会社
代表取締役 栗田 道郎


製 造 場 の 名 称 及 び 所 在 地 中国 江蘇省南通市港閘経済開発区永興大道
南通DASケミカル(株)南通工場
ブラジル国 サンパウロ州ジャケレイ市H. A. カステロ ブラソコ3200、プレジテント通り
ダウ・アグロサイエンス工業(株)ジャレイ工場
コロンビア国 クンティヤマルカ ソウチャ カスタ1 トランスパザール6#13-90
シガラコロンビア(株)同社工場
コロンビア国 カレーラ 50号線 13-209番 ソラガード アトランティコ
ダウ・アグロサイエンスコロンビア バランキヤ工場

小 分 製 造 場 群馬県富岡市富岡216
日本農薬工業(株)富岡工場
鹿児島市南栄2-9
サンケイ化学(株)鹿児島工場

農薬取締法第6条の2第2項の規定に基づき 平成 28 年 5 月 25 日 付けをもって上記のとおり
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

平成 28 年 5 月 25 日

農 林 水 産 大 臣 森 山 裕



(別記)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンベブを含む農薬の総使用回数	
ぶどう	晩腐病 褐斑病 さび病 べと病 黒とう病	1000倍	200~700 Q/10a	収穫45日前まで	2回以内	散布	2回以内	
りんご	斑点落葉病 赤星病 黒星病 黒点病 モリア病 すす点病 すす斑病	500~600倍		500倍	収穫30日前まで		3回以内	3回以内
	輪紋病	600倍						
	褐斑病 炭疽病	400~600倍						
なし	赤星病 黒星病 黒斑病 輪紋病	400~600倍		600倍	収穫21日前まで		5回以内	5回以内
もも	黒星病 果実赤点病 すすかび病	600倍			収穫21日前まで		3回以内	3回以内
おうとう	灰星病 炭疽病							
かき	炭疽病 落葉病 黒星病 黒点病	400~800倍		400倍	収穫45日前まで		2回以内	2回以内
	黄斑病 小黒点病	600~800倍						
みかん	カンザシダニ	1000倍		400倍	収穫30日前まで		4回以内	無人ヘリコプターによる散布
	そうか病	400倍						
	褐色腐敗病 そばかす病 赤衣病 炭疽病(さび果) チャキロアザミマ	400~600倍						
	黒点病	5倍	4Q/10a					
かんきつ (みかんを除く)	黒点病 黄斑病 小黒点病	600~800倍	200~700 Q/10a	収穫90日前まで	4回以内	散布	4回以内	
	カンザシダニ	1000倍						
	褐色腐敗病 そばかす病 赤衣病 炭疽病(さび果) 汚れ果症 幹腐病 チャキロアザミマ	600倍						
	黒点病	5倍						4Q/10a

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マゼブを含む農薬の総使用回数
びわ	たてぼや病	600倍	200~700 Q/10a	落弁期まで	2回以内	散布	2回以内
マンゴー	炭疽病	800倍		収穫45日前まで			
あけび (果実)	そうか病 斑点細菌病	500倍		収穫60日前まで			
すいか	炭疽病 べと病 つる枯病 疫病 褐斑細菌病	400~600倍	100~300 Q/10a	収穫7日前まで	7回以内		7回以内
メロン	炭疽病 べと病 つる枯病 疫病 斑点細菌病				5回以内		5回以内
かぼちゃ	炭疽病 べと病 つる枯病 疫病	600倍		収穫21日前まで	2回以内		2回以内
はくさい	べと病 白斑病 黒斑病			1回	1回		
キャベツ	べと病	400~600倍		100~300 Q/10a	収穫30日前まで		3回以内
たまねぎ	べと病 さび病 黒斑病 灰色腐敗病 灰色かび病					5回以内	5回以内
	白色疫病				400~500倍		
ねぎ	べと病 さび病 黒斑病	600倍			収穫14日前まで	3回以内	3回以内
トマト	疫病 葉かび病 輪紋病	800倍	収穫前日まで		2回以内	2回以内	
きゅうり	炭疽病 褐斑病 疫病 黒星病 つる枯病	600倍			3回以内	3回以内	
	べと病	600~800倍					
アスパラガス (露地栽培)	斑点病	500倍	収穫終了後 但し、 秋期まで		6回以内	6回以内	
	茎枯病 褐斑病	400~600倍					
ばれいしょ	夏疫病 疫病	100倍	25 Q/10a	収穫7日前まで	10回以内	10回以内 (無人ヘリ 散布は 3回以内)	
	疫病	8倍			3.2 Q/10a		3回以内

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンベグを含む農薬の総使用回数					
らっかせい	そうか病 褐斑病	400~600倍	100~300 Q/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内					
いんげんまめ	炭疽病	600倍		100~300 Q/10a	収穫30日前まで		4回以内	3回以内	4回以内			
そらまめ 未成熟そらまめ	さび病 輪紋病	400~600倍					3回以内		3回以内	3回以内		
あずき	茎疫病 さび病	400倍										
だいず	べと病 紫斑病	400~600倍			100~300 Q/10a		収穫45日前まで	4回以内	散布	4回以内		
やまのいも	葉渋病 炭疽病						400~600倍				収穫21日前まで	
にんにく	葉枯病	400~500倍					5回以内	5回以内		5回以内		
	白斑葉枯病	400倍										
にんじん	黒葉枯病	400~600倍					収穫7日前まで	3回以内		3回以内		
いちご	じゃのめ病 炭疽病	600倍					100~300 Q/10a	仮植栽培期 但し 収穫76日前まで		6回以内	6回以内	
								てんさい		褐斑病	8倍	1.6 Q/10a
		125倍						25 Q/10a				
		400~600倍										
トルコギキョウ	炭疽病	400倍	100~300 Q/10a			発病初期		8回以内		散布	8回以内	
ばら きく カーネーション	黒星病 さび病 べと病 炭疽病 灰色かび病	400~600倍										
	斑入りアマドコロ	褐色斑点病 斑点病		400倍								
	シクラメン	炭疽病		500倍								
ベンジャミン	炭疽病	400倍		200~700 Q/10a	1回	1回						
すぎ	斑点細菌病	400倍		200~700 Q/10a	8回以内	8回以内						
	赤枯病	400~600倍	200~700 Q/10a	2回以内	2回以内							