

# スミチオン<sup>®</sup>乳剤の適用害虫と使用方法

\*印は、収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫（摘採）前の日数と、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

樹木類・花き類・観葉植物						
作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用量	使用時期※	総使用回数※	使用方法
樹木類	アメリカシロヒトリ	500~1000	200~700ℓ/10a	—	6回以内	散布
	フラーバラゾウムシ アブラムシ類・ダンバイムシ類	1000				
	オオハリセンチュウ	500	—	移植前	本剤1回 M E P 6回以内	
ばら	アブランムシ類	1000~2000	100~300ℓ/10a	—	6回以内	散布
	フラーバラゾウムシ	1000				
きく	アブランムシ類	1000~2000	200~700ℓ/10a	—	6回以内	散布
	フラーバラゾウムシ カメムシ類・ヨトウムシ類					
つづじ類	グンバイムシ類・ハマキムシ類		100~300ℓ/10a	—	6回以内	散布
カーネーション	アザミウマ類・クロウリハムシ					
宿根かすみそう	ハモグリバエ類					
げききつつ	ミカンキジラミ		200~700ℓ/10a	発生初期	6回以内	散布
りんどう	ヒラズハナアザミウマ					
花き類	アオムシ・バッタ類 観葉植物					
アスター	ハマキムシ類・アザミウマ		100~300ℓ/10a	—	6回以内	散布
ソリダゴ	カバメムシ類					
スター・チス	コガネムシ類					
シネラリア	シンクイムシ類		200~700ℓ/10a	—	6回以内	散布
斑入りアマドコロ	コウモリガ					
ききょう	ヨトウムシ					
せんりょう	アザミウマ類・カメムシ類		200~700ℓ/10a	—	6回以内	散布
こでまり	カイガラムシ類					
しきみ	クスアナアキゾウムシ					
にしきぎ	ケムシ類		200~700ℓ/10a	—	6回以内	散布
しゃりんばい	シンクイムシ類					
だいおうしょう						
さかき	ハマキムシ類		200~700ℓ/10a	—	6回以内	散布
さんごじゅ	ワタノメイガ					

その他

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期※	総使用回数※	使用方法	
茶	コカクモンハマキ・チャノホソガ	700~1000	200~400ℓ/10a	摘採21日前まで	1回	散布	
まめ科牧草	ヨコバイ類・アブラムシ類・ウンカ類 ウリハムシモドキ・ゾウムシ類	1000~2000	100~300ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内		
ムギダニアワヨトウ	ムギダニアワヨトウ	1000					
いね科牧草	ヨコバイ類・ア布拉ムシ類・ウンカ類 ウリハムシモドキ・ゾウムシ類	1000~2000					
飼料用とうもろこし	アブランムシ類	2000	25~180ℓ/10a 60~150ℓ/10a 0.3~2ℓ/m <sup>2</sup>	収穫30日前まで	1回		
たばこ	ヨトウムシ	1000		収穫20日前まで			
しちとうい	イネクロカメムシ			発生初期	2回以内		
芝	シバツトガ・スジキリヨトウ コガネムシ類幼虫 シバオサゾウムシ	3ℓ/m <sup>2</sup>	100~300ℓ/10a				
桑	クワゾウムシ成虫		幼虫発生期	6回以内			
			成虫発生期				
作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期※	総使用回数※	使用方法
水田作物、 （休耕田）	ヨシ、オギ、スキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田	カメムシ類	1000	60~150ℓ/10a	—	4回以内	散布

使用上の注意(抜粋)    <使用に際してはラベル等の注意事項をご確認ください>



●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。 ●空容器は画場等に放置せず適切に処理してください。

大地のめぐみ、まっすぐ人へ  
**SCC GROUP**

2015年4月作成(エヌ・ワイ・ピー)

住友化学株式会社  
お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト I-農力 <http://www.i-nouryoku.com>

27H4D15S83:N

稻 小麦 大麦 りんご かき もも  
みかん なつみかん おうとう う  
め オリーブ ほうれんそう トマト  
ねぎ いつの時代にも確かな手応え  
害虫専科50年以上の実績  
う たまね  
ぎ な  
す メ  
ロン しろ  
うり かぼ  
ちゃ すい  
か だいず えんどうまめ いんげ  
んまめ あずき そらまめ えだま  
め さやいんげん 茶 とうもろこ  
し ばれいしょ こんにゃく  
しょ わらび 芝 まめ科牧草

ごぼ  
たまね  
な  
メ  
しろ  
かぼ  
すい  
いんげ  
とうもろこ  
シ  
シ

スミチオン<sup>®</sup> 乳剤

農林水産省登録第4962号

# スニチオン<sup>®</sup>乳剤 の適用害虫と使用方法

有効成分：MEP [O,O-ジメチル-O-(3-メチル-4-ニトロフェニル)チオホスフェート] ..... 50.0%

\*印は、収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫(摘採)前の日数と、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

## 果樹類

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期※	総使用回数※	使用方法			
りんご (有袋栽培)	アブランムシ類	1000~2000	200~700ℓ/10a	収穫30日前まで	3回以内	散 布			
	ナシヒメシングクイ・モモシングクイガ ハマキムシ類・ナシグンバイ	1000							
	アメリカシロヒトリ	1500		収穫14日前まで	6回以内				
	クワコナカイガラムシ	1000~2000							
	アブランムシ類	1000~2000		収穫21日前まで	1000				
	シンクイムシ類・ハマキムシ類 ナシグンバイ・ナシホソガ・ナシチビガ カメムシ類・アメリカシロヒトリ	1000							
	クワコナカイガラムシ	1500							
	アブランムシ類	1000~2000		収穫45日前まで	1000				
	シンクイムシ類・ハマキムシ類 ナシグンバイ・ナシホソガ・ナシチビガ カメムシ類・アメリカシロヒトリ	1000							
	クワコナカイガラムシ	1500							
かき (無袋栽培)	アブランムシ類	1000~2000		本剤3回以内 M E P 3回以内 (樹幹処理は2回以内)	1000				
	ハマキムシ類・カキノヘタムシガ カキホソガ・フジコナカイガラムシ オオタコナカイガラムシ・カメムシ類 イラガ類・メリカシロヒトリ・ミガ類若齧幼虫	1000							
	アブランムシ類・モモハモグリガ ナシヒメシングクイ(心折防止)	1000~2000		本剤6回以内 M E P 6回以内 (樹幹処理は1回以内)	1000				
	ナシヒメシングクイ・モモシングクイ・ハマキムシ類 クワシロカイガラムシ・カメムシ類	1000							
	クワコナカイガラムシ	1500		収穫3日前まで	1000				
	アブランムシ類・モモハモグリガ ナシヒメシングクイ	1000~2000							
	ハマキムシ類・サンホーゼカイガラムシ アサミウマ類・カメムシ類・カネタタキ ミカンツボミダマバエ・ケシキスイ類 コアオハナムグリ・フラー・バラゾウムシ類	1000		収穫14日前まで	1000				
	アブランムシ類	1000~2000							
	アブランムシ類	1000		本剤3回以内 M E P 3回以内 (樹幹処理は1回以内)	1000				
	アブランムシ類	1000~2000							
みかん 大粒種ぶどう	アブランムシ類	1000~2000	200~700ℓ/10a	本剤5回以内 M E P 5回以内 (樹幹処理は1回以内)	1000				
	ハマキムシ類・サンホーゼカイガラムシ アサミウマ類・カメムシ類・カネタタキ ミカンツボミダマバエ・ケシキスイ類 コアオハナムグリ・フラー・バラゾウムシ類	1000							
	アブランムシ類	1000~2000		収穫21日前まで	1000				
	アブランムシ類	1000							
	アブランムシ類	1000~2000		本剤2回以内 M E P 4回以内 (収穫終了後から 萌芽までは2回以内、 萌芽後は2回以内)	1000				
	アブランムシ類・フタテンヒメヨコバイ ブドウカシバ・ブドウトリバ	1000~2000							
	アブランムシ類	1000~2000		収穫30日前まで	1000				
	アブランムシ類・フタテンヒメヨコバイ ブドウカシバ・ブドウトリバ	1000~2000							
	アブランムシ類	1000~2000		収穫90日前まで	1000				
	アブランムシ類	1000~2000							
おうとう うめ オリーブ いちょう(種子)	アブランムシ類	1000~2000	本剤2回以内 M E P 2回以内 (樹幹処理及び灌注 処理は合計1回以内)	1000					
	ハマキムシ類・ナシグンバイ	1000							
	アブランムシ類	1000~2000	収穫14日前まで	1000					
	アブランムシ類	1000~2000							
	アブランムシ類	50	0.3~3ℓ/樹	3回以内					
	オリーブアナキゾウムシ	100							
	コウモリガ・ヒメボトウ	100							
	アブランムシ類	100		収穫60日前まで	1000				
	アブランムシ類	100							

プロの農家から家庭園芸まで さまざまな場面にスニチオン

## 稻・麦類

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期※	総使用回数※	使用方法
稻	ニカメイチユウ第1世代	1000~2000	60~150ℓ/10a	収穫21日前まで	1000	
	ニカメイチユウ第2世代	800~1000				
	サンカメイチユウ第3世代	1000		本剤2回以内 M E P 3回以内 (種もみへの処理は1回 以内、育苗箱散布は1回 以内、本田では2回以内)	1000	
	ヒメビトビウンカ・カメムシ類	1000~2000				
	イネットムシ・イネシンガレセンチュウ イネドロオイムシ・アブラムシ類	1000~2000		6~72時間浸漬	1000~1500	
	イネハモグリバエ	1000~2000				
	イネヒメハモグリバエ	2500		100~150ℓ/10a	1000~1500	
	フタオビコヤガ	2000~4000				
	ニカメイチユウ・カメムシ類	300		100~150ℓ/10a	1000~1500	
	イネシンガレセンチユウ	100				
稻(箱育苗)	アブラムシ類・アワヨトウ ムギモグリバエ	1000~2000	100~150ℓ/10a	収穫21日前まで	1000	
	アブランムシ類	60~150ℓ/10a				
	アブランムシ類	60~150ℓ/10a		硬化期~移植前日	1000	
	アブランムシ類	25ℓ/10a				
	アブランムシ類	1000		1回	1000	散 布
小麦 小麥	アブランムシ類	1000~2000	60~150ℓ/10a	収穫7日前まで	1000	
	アブランムシ類	60~150ℓ/10a				
	アブランムシ類	60~150ℓ/10a		1回	1000	
	アブランムシ類	25ℓ/10a				
	アブランムシ類	1000~2000		散 布	1000	散 布
大麦	アブランムシ類・アワヨトウ ムギモグリバエ	1000~2000	60~150ℓ/10a	収穫7日前まで	1000	
	アブランムシ類	60~150ℓ/10a				
	アブランムシ類	60~150ℓ/10a		1回	1000	
	アブランムシ類	25ℓ/10a				
	アブランムシ類	1000~2000		散 布	1000	散 布

\* 所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用する  
\*\* 少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の地上液剤散布装置を利用する

## 野菜類・いも類・雑穀類

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期※	総使用回数※	使用方法
いちご(露地栽培)	アブランムシ類	2000	100~300ℓ/10a	収穫21日前まで	1000	
	アブランムシ類	1000~2000				