



農薬登録票

登録番号 第20863号 登録年月日 平成26年7月30日

登録の有効期間 平成29年7月29日

農薬の種類 メソミル水和剤

農薬の名称 ランネート45DF

物理的・化学的性状 青色水和性微粒及び細粒

有効成分の種類及び含有量 S-メチル-N-[(メチルホスホリル)メチル]チアゾリジン 45.0%

その他の成分の種類及び含有量 鉱物質微粉、界面活性剤、色素等 55.0%

適用病害虫の範囲及び使用方法 (別記のとおり)


製造者又は輸入者の氏名及び住所 栃木県宇都宮市岩曾町1215番地
宇都宮化成工業株式会社
代表取締役 厨子 彰英

製造場の名称及び所在地 栃木県宇都宮市岩曾町1215
宇都宮化成工業(株)宇都宮工場
岡山県岡山市北区延友454
宇都宮化成工業(株)岡山分工場
岡山県岡山市北区延友454
山陽薬品(株)岡山工場

農薬取締法第6条の2第2項の規定に基づき 平成27年1月21日 付けをもって上記のとおり変更の登録をしたので本票を書替交付する。

平成27年1月21日 農林水産大臣臨時代理

国務大臣 太田 昭



(別記)

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 刈り込みを含む農薬の総使用回数 |
|------------|--|------------|--|------------|---------|------|-------------------------|
| すいか(露地栽培) | ワアブラムシ | 1000~2000倍 | 100~300 Q/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| かぼちゃ | | | | | 3回以内 | | 3回以内 |
| いちご | イチゴセンチュウ | 1000倍 | 1~2 Q/m ² 2~3 Q/m ² | 育苗期 | 4回以内 | 灌注 | 4回以内 |
| | イチゴネグサセンチュウ | | | 定植後生育初期 | | | |
| ピーマン(露地栽培) | タバコガ ハスモントウ | 1000~2000倍 | 100~300 Q/10a | 収穫開始14日前まで | 4回以内 | 灌注 | 4回以内 |
| キャベツ | アオムシ コガ ヨウムシ ハスモントウ アブラムシ類 タマギンウバ | | | 収穫3日前まで | | | |
| はくさい | アオムシ コガ ヨウムシ アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 100~300 Q/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 (は種時の土壌混和は1回以内) |
| だいこん | アオムシ コガ アブラムシ類 ハイダラメイガ | | | 収穫14日前まで | | | |
| こまつな | アブラムシ類 | 1000倍 | 100~300 Q/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| チンゲンサイ | アオムシ アブラムシ類 | | | 収穫3日前まで | | | |
| かぶ | アオムシ アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 100~300 Q/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| カリフラワー | ヨウムシ アブラムシ類 | | | 収穫14日前まで | | | |
| ブロッコリー | アオムシ アブラムシ類 | 1000倍 | 100~300 Q/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| レタス | アオムシ アブラムシ類 オタバコガ ナメジキ | | | 収穫14日前まで | | | |
| サラダ菜 | ヨウムシ アブラムシ類 オタバコガ | 1000~2000倍 | 100~300 Q/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
| ほうれんそう | ヨウムシ シメジロアザミ | 1000~2000倍 | 100~300 Q/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| ねぎ | アブラムシ類 | 1000倍 | 100~300 Q/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| たまねぎ | シイロアザミ | 1000~2000倍 | 100~300 Q/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| しょうが | ハスモントウ | 1000~2000倍 | 100~300 Q/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| ばれいしょ | ジャガイモガ ナメジキ アブラムシ類 | 1000倍 | 100~300 Q/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| かんしょ | アブラムシ類 ハスモントウ ナメジキ | 1000~2000倍 | 100~300 Q/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ミミズを含む農薬の総使用回数 | |
|--------|--|----------------|------------------|----------------------|----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| だいず | ハスモンヨトウ シロイモジマダラメイガ マメシクイガ | 1000～ 2000倍 | 100～300 Q/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 散布 | 4回以内 | |
| えだまめ | カムシ類 ツクサガ | | | 収穫7日前まで | 3回以内 | | 3回以内 | |
| てんさい | ヨトウムシ トビハムシ | | | 5回以内 | 5回以内 | | | |
| にんじん | ヨトウムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 | 1000倍 | 100～300 Q/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 (は種前の土壌 混和は1回以内) | |
| セルリー | | 2000倍 | | 収穫30日前まで | 1回 | | 2回以内 | |
| パセリ | アブラムシ類 | | | 1回 | 1回 | | | |
| ごぼう | | 1000倍 | | 収穫7日前まで | 2回以内 | | 2回以内 | |
| アスパラガス | ネギアザミマ ネギアザミマ ナメタジ類 | | | 1～3 Q/m ² | 収穫前日まで | | 1回 | 2回以内 (散布は1回以内、 灌注は1回以内) |
| にら | ネギアザミマ タネコ類 | | | 1 Q/m ² | 収穫21日前まで | | 2回以内 | 2回以内 |
| らっきょう | タネコ類 | | | | | | | |
| 食用ゆり | クロハネギノコハネギ類 | 500倍 | — | 植付前 | 1回 | 30分間 種球浸漬 | 1回 | |
| 茶 | ハスモンヨトウ チャトウコナジラミ | 1000倍 | 200～400 Q/10a | 摘採21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | |
| | コカクモンハマキ チャハマキ チャノホソガ ミドリヒメヨコバネ | 1000～ 1500倍 | | | | | | |
| | チャノキイロアザミマ ツマクノアオアシカメ | 1000～ 2000倍 | | | | | | |
| たばこ | タバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ | | 25～180 Q/10a | 収穫10日前まで | | | | |