

農薬登録票

登録番号 第 22584 号

登録年月日 平成28年 2月 17日

農薬の種類 アセタミプリド水溶剤

農薬の名称 日農モスピラン顆粒水溶剤

物理的性状 青色水溶性細粒及び微粒

有効成分の種類及び含有量 (E)-N¹-[(6-クロロ-3-ピリジリル)メチル]-N²-シアノ-N³-メチルセトアミジン 20.0%

その他の成分の種類及び含有量 乳糖、色素、界面活性剤等 80.0%

適用病害虫の範囲及び使用方法 (別記1のとおり)

製造者又は輸入者の氏名及び住所 東京都中央区京橋一丁目19番8号
日本農薬株式会社
代表取締役社長 岩田 浩幸

製造場の名称及び所在地 富山県高岡市向野本町300
日本曹達㈱高岡工場
群馬県高崎市大八木町888
新富士化成薬㈱高崎工場

農薬取締法第6条第2項の規定に基づき、令和4年7月19日 付けをもって上記のとおり変更の登録をしたので本票を畫替交付する。

農林水産大臣 金子 原 二 郎

(別記1)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	747Pリを含む農薬の総使用回数
かんきつ	アブラムシ類、シツメイカ類、アザミヤカ類、カイラムシ類、コマダガラ成虫、コオナメダガラ類、クダモノ類、アザミヤカ類、カメシメ類、シツメイカ	2000～4000倍	200～700 Q /10a	収穫14日前まで		散布	
	コナジラミ類	4000倍					
	コマダガラ成虫	200～400倍	30～75 Q /10a		主幹から株元に散布		
りんご	アブラムシ類、キンモンボリカ、キンモンボリカ、シツメイカ類、カメシメ類、リンゴワタムシ	2000～4000倍		収穫前日まで			
	カイラムシ類、モチヨッキリウメシ、コナジラミ類成虫	4000倍					
	ケムシ類、キリカ類	2000倍					
なし	カメシメ類、アブラムシ類、シツメイカ類、カイラムシ類、カキヒメコバエ	2000～4000倍		収穫前日まで			
	ナシボリカ	4000倍					
もも	アブラムシ類、モチヨッキリウメシ類、アザミヤカ類、カメシメ類、コナジラミ類成虫、モチヨッキリウメシ	2000～4000倍			3回以内		3回以内
	コナジラミ類、カイラムシ類、アザミヤカ成虫	2000倍					
ネクタリン	アブラムシ類、モチヨッキリカ、シツメイカ類、アザミヤカ類、カメシメ類、コナジラミ類成虫、モチヨッキリウメシ	4000倍	200～700 Q /10a	収穫3日前まで		散布	
ぶどう	カイラムシ類、アザミヤカ類、アザミヤカ成虫、コナジラミ類成虫	2000～4000倍		収穫14日前まで			
	ツマクノアオカシメ、トビイロトラカ	2000倍	収穫後秋期				
	アトウチカキリ		収穫前日まで				
かき	アザミヤカ類、カイラムシ類、カキノハムシカ、カキヒメコバエ、カメシメ類	2000～4000倍		収穫前日まで			
かき(葉)		4000倍		収穫14日前まで			
小粒核果類(うめ、すももを除く)	アブラムシ類	2000～4000倍		収穫前日まで			
	カイラムシ類、クビアカツカキリ	2000倍					
うめ	アブラムシ類	2000～6000倍		収穫前日まで			
	ケキスイ類、ノメトカリキリカ、カイラムシ類、クビアカツカキリ	2000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	7/21/21を含む農薬の総使用回数		
すもも	カイラムシ類、カイツツカミキリ	2000倍	200~700 Q /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
	アブラムシ類、シロカビ類、スモミハダニ	2000~4000倍							
おうとう	カイラムシ類、カイツツカミキリ	2000倍			2000~4000倍		1回	1回	1回
	カキノミ類、オトクシヨウジ ヨウハエ	2000~4000倍							
	アザミヤ類	4000倍							
びわ	アブラムシ類、カミキリ類	2000~4000倍			3回以内		3回以内	3回以内	
	カイラムシ類、ヒラキツラミ								
いちじく	アザミヤ類、ホシカミキリ、カイラムシ類、イソクビトリモトキ	2000倍							
かりん	ナシシロカイ						収穫14日前まで	2回以内	2回以内
あけび(果実)、アヒロ	アブラムシ類	4000倍					収穫7日前まで		
マンゴー	アザミヤ類、カイラムシ類	2000倍					収穫35日前まで		
キウフルーツ	カイラムシ類	2000~4000倍			3回以内		収穫7日前まで	3回以内	3回以内
	キウヒヨウゴイ								
ゴレンソ	カイラムシ類	4000倍					収穫21日前まで		
たらのぎ	センカミキリ	2000倍					収穫45日前まで		
ブルーベリー	オトクシヨウジ ヨウハエ	4000倍					収穫前日まで	1回	1回
パッションフルーツ	カイラムシ類	2000倍			3回以内		収穫30日前まで	2回以内	2回以内
レイシ	カキノミ類						3回以内	3回以内	
ウツク	カキノミ類						1回	1回	
くり	モノノマダラノミカ	2000~4000倍			3回以内		収穫7日前まで	3回以内	3回以内(樹幹注入は1回以内)
	クリキリノミカ、クリミカ								
	アブラムシ類、カイラムシ類								
食用さくら(葉)	アザミヤ類	4000倍		収穫3日前まで	1回	1回			
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミヤ類			収穫45日前まで	6回以内	6回以内			
さんしょう(果実)	ゴマダカミキリ幼虫	200倍	20 Q /10a	収穫7日前まで	3回以内	樹幹散布	4回以内(散布は1回以内、樹幹散布は3回以内)		
麦類		4000倍	60~150 Q /10a		2回以内		2回以内		
とうもろこし(子実)	アブラムシ類	2000~4000倍	100~300 Q /10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内		
未成熟とうもろこし				収穫前日まで					

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	75%エチオン・グリホサートを含む農薬の総使用回数
ヤングコーン	アブラムシ類	2000倍	100～300 Q /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
ばれいしょ	アブラムシ類	2000～4000倍		収穫7日前まで	3回以内		4回以内(植付時の土壌混和は1回以内、植付後は3回以内)
	アブラムシ類	2000～6000倍		収穫前日まで			
かんしょ	アブラムシ類、ヨモシカノコハシ	4000倍		収穫7日前まで	5回以内		3回以内
やまのいも	アブラムシ類、アザミヤカ類、カマキリ			収穫7日前まで			
やまのいも(種芋栽培)				種芋掘取り前日まで			
やまのいも(むかご)	収穫21日前まで			3回以内			
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く)	アブラムシ類、コナジラミ類、アザミヤカ類						
えだまめ	アブラムシ類、コナジラミ類、アザミヤカ類、カマキリ類、フタスジヒメハシ、マシクイ	4回以内(は種時または定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)					
さやいんげん	アブラムシ類	2000～4000倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内
	コナジラミ類、アザミヤカ類、カマキリ類	4000倍					
さやえんどう	アブラムシ類、コナジラミ類、アザミヤカ類	2000～4000倍		収穫14日前まで	3回以内		5回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、散布、くん煙及び1%粒剤の株元散布は合計3回以内)
豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめを除く)	アブラムシ類、コナジラミ類、アザミヤカ類						
だいず	アブラムシ類、アブラムシ類、マシクイ、コナジラミ類、アザミヤカ類、フタスジヒメハシ						
いんげんまめ	アブラムシ類、コナジラミ類、アザミヤカ類、カマキリ類	2000～4000倍		収穫前日まで	3回以内		4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内)
きゅうり	コナジラミ類、ウリノメイガ		2000倍				
	アブラムシ類、アザミヤカ類		2000～4000倍				
すいか	ウリハシ	4000倍	収穫3日前まで	2回以内	3回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)		
	コナジラミ類、ウリノメイガ	2000倍					
	アブラムシ類、アザミヤカ類	2000～4000倍					
うり類(漬物用)	ウリハシ	4000倍	収穫前日まで	2回以内	3回以内		
	アブラムシ類、アザミヤカ類	2000～4000倍					
かぼちゃ	アブラムシ類、ウリハシ	2000～4000倍	収穫前日まで	2回以内	3回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)		
	カボチャミハエ、ウリノメイガ	2000倍					

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	777777を含む農薬の総使用回数		
メロン	777777類	8000倍	100~300 L / 10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内		
にがうり、カボチャ		4000倍		2回以内				2回以内	
まくわうり				777777類、カハハシ	2000倍		3回以内	4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内)	
トマト、ミニトマト	777777類、コジツメ類、777777類	2000倍		2000~4000倍	収穫前日まで		3回以内	3回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回以内)	
なす	777777類、テントウムシガキ類、777777類、コカカハシ類	2000倍							
ピーマン	777777類、777777類、コジツメ類	4000倍		8000倍	2回以内		2回以内(定植時の土壌混和は1回以内)	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	
とうがらし類(ししとうを除く)	777777類	8000倍							6回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計5回以内)
ししとう									
キハツ	コカカ、アホシ、キスジノミハシ	1000~2000倍		2000~4000倍	収穫7日前まで		6回以内	4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)	
	777777類、777777類	2000倍							4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)
カブツクリ	コカカ、アホシ、777777類	2000倍	777777類	収穫14日前まで	3回以内	4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)			
ブロッコリー	コカカ、アホシ、777777類、777777類						4000倍	2回以内	
茶ブロッコリー	777777類	4000倍	1000~2000倍	収穫14日前まで	3回以内	4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)			
はくさい	コカカ、アホシ	2000~4000倍							
	777777類	4000倍							
だいこん	コカカ、アホシ、キスジノミハシ、カハハシ	2000倍	2000~4000倍	収穫7日前まで	1回	1回			
	カハハシ、777777類	2000倍							
はつかだいこん	777777類	2000倍	777777類	収穫21日前まで	1回	1回			
わさびだいこん	コカカ								
かぶ	キスジノミハシ、777777類	4000倍	777777類、キスジノミハシ、カハハシ	収穫14日前まで	1回	2回以内(粒剤の処理は1回以内、散布は1回以内)			
	カハハシ								
なばな類	777777類、キスジノミハシ、カハハシ	4000倍	777777類	収穫7日前まで	1回	2回以内(粒剤の処理は1回以内、散布は1回以内)			
非結球あぶらな科野菜類(チンゲンサイを除く)									
チンゲンサイ	777777類	4000倍	777777類	収穫7日前まで	1回	2回以内(粒剤の処理は1回以内、散布は1回以内)			

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	7/27/21を含む農薬の総使用回数			
ササゲ	アブラムシ類、キスジ類	4000倍	100~300 L / 10a	収穫7日前まで	1回	散布	1回			
非結球トマト	アブラムシ類	2000倍			2回以内		3回以内(土壌混和は1回以内、散布は2回以内)			
トマト					1回		1回			
いちご	アブラムシ類、キスジ類、チバクダマ、キノコハエ	2000~4000倍			2000倍		収穫前日まで	2回以内	3回以内(土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	
	オシロイバナ類、アザミ類	2000倍								
つるな、レンコン	アブラムシ類	4000~8000倍			8000倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内
セージ							収穫7日前まで			
パプリカ、タイム、チンピラ、テラ(菜)										
マヨナマ										
わかさ、はつか										
パセリ										
たまねぎ										
ねぎ										
わけぎ、あざつき										
にら	アブラムシ類、アザミ類	4000倍			収穫前日まで		3回以内	3回以内		
らっきょう	アザミ類	2000倍			収穫14日前まで					
にんにく	キノコ、アザミ類、アブラムシ類	2000~4000倍			2000~4000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内
アスパラガス	アブラムシ類、オシロイバナ類、アザミ類、シロカサネ、カマキリ類	4000倍								
トビacco	アブラムシ類	2000倍			2000倍		1回	1回		
ナス	アブラムシ類、キノコハエ	2000~4000倍			4000倍		3回以内	4回以内(粒剤の株元散布は1回以内、散布は3回以内)		
非結球レタス	アブラムシ類、アザミ類、チバクダマ	4000倍	4000倍	収穫7日前まで	1回	2回以内(粒剤の株元散布は1回以内、散布は1回以内)				
おかひじき、くさきしゃ、ふだんそう、エンサイ	アブラムシ類				2回以内	2回以内				
食用ぎく	アザミ類	2000~8000倍	2000倍	収穫14日前まで	2回以内	2回以内				
		2000倍								

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アミダールを含む農薬の総使用回数
食用ゆり	アミダール類	4000～8000倍	100～300 Q /10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
しょくようほおぎ		4000倍		3回以内	3回以内		
食用花(食用さく)、食用ミナソウ、食用金魚草、食用アザミを除く)、ほうれんそう		8000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
食用金魚草、食用アザミ				1回	1回		
食用ミナソウ		4000～8000倍		収穫3日前まで	2回以内		2回以内
てんさい	アミダール類、アザミ類	200倍	100～300 Q /10a	定植前		苗床灌注	3回以内(苗床灌注は1回以内)
みつば	アミダール類	8000倍	100～300 Q /10a	収穫7日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで	1回	散布	1回
しゅんぎく				収穫3日前まで			2回以内
しそ、しそ(花穂)、クワゴン		4000倍		2回以内			2回以内
ふき	アミダール類	3000倍		収穫14日前まで	2回以内	散布	3回以内(粒剤の株元散布は1回以内、散布及びびくん煙は合計2回以内)
わらび	アミダール類	4000倍		収穫前日まで			2回以内
なずな、ははこぎ	アミダール類	8000倍		収穫7日前まで	1回	散布	1回
セリ	アミダール類、アザミ類	4000倍		収穫7日前まで	2回以内		2回以内(定植時の土壌混和は1回以内)
モロヘイ	アミダール類			収穫21日前まで	1回		1回
アザミ(茎葉)	アミダール類、アザミ類	8000倍		収穫3日前まで			
なんてん(葉)	アミダール類			収穫21日前まで	2回以内		2回以内
にんじん、あしたば	アミダール類、アザミ類	4000倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内
クワ	アミダール類			収穫3日前まで			
さるなし	アミダール類	2000倍	200～400 Q /10a	収穫7日前まで	2回以内		2回以内
なたね	アミダール類	4000倍		収穫45日前まで	1回		1回
びやくし	アミダール類	2000～4000倍	100～300 Q /10a	発生初期	5回以内		5回以内
おけら	アミダール類						
とうき	アミダール類	2000倍					
茶	アミダール類、アザミ類	4000倍	200～400 Q /10a	摘採7日前まで	1回		1回

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アザラシを含む農薬の総使用回数
ソカム	アザラシ類	6000倍	100～300ℓ /10a	収穫45日前まで	3回以内	散布	3回以内
飼料用とうもろこし、まめ科牧草				収穫90日前まで			
いね科牧草				収穫30日前まで			
花き類・観葉植物(ストク、りんどうを除く)、ストク	アザラシ類	2000倍	100～700ℓ /10a	発生初期	5回以内	5回以内	
	アザラシ類	2000～4000倍					
りんどう	アザラシ類、リントウハハキ	2000倍	100～700ℓ /10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
	アザラシ類						
樹木類(まつ、やなぎ、さくらを除く)	クンパインシ類	2000倍	200～700ℓ /10a	発生初期	5回以内	5回以内(樹幹注入は1回以内)	
まつ	アザラシ類	4000倍					
やなぎ	クンパインシ類	2000倍					
	ヤキコバキリ	2000～4000倍					
さくら	クンパインシ類、クンパインシ	2000倍	25～180ℓ /10a	収穫10日前まで	2回以内	3回以内(定植後は2回以内)	
たばこ	アザラシ類	2000～4000倍					