

畑の雑草をしっかりと抑えます。


畑作用除草剤

デュポン

レンザー 水和剤

有効成分：レナシル.....80.0%


農林水産省登録 第9561号



いちご



ほうれんそう



かんしょ



畑を草から守ります。

レンザーの特長

- 雜草発生前の使用により、高い防除効果を發揮する土壤処理型除草剤です。
- メヒシバやハコベなど、多くの一年生イネ科及び広葉雑草に有効です。
- ほうれんそうに対して、すぐれた選択性を有します。




丸和バイオケミカル株式会社

使用上の注意をよく守って、お使いください。

■使用方法

適用作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当たり		使用方法	本剤及びレナシルを含む農薬の総使用回数
			使用量	散布液量		
いちご	畠地 一年生雑草	定植後 (収穫120日前まで)	100~150g	70~100ℓ	全面土壤散布	1回
ほうれんそう		は種覆土直後				
かんしょ		植付後 (但し植付3日後まで)				



■使用上の注意

- 生育した雑草には効果が低いので雑草発生前に散布してください。
- 砂地で水はけのよい畠では使用しないでください。また沖積土の畠では薬量をひかえめにしてください。
- 地下水位の高い所や降雨後など土壤が湿りすぎている場合は、薬害を生じる恐れがあるので使用しないでください。
- 本剤は残効性が長く、後作物に対して影響を及ぼすことがあるので注意してください。とくに、いね科、うり科及びあぶらな科作物などは影響を受けやすいので、本剤処理後6ヶ月以内にこれらを後作物として栽培しないでください。
- ほうれんそのは種後に使用する場合は、覆土深は1cm以上とし発芽後の使用はしないでください。
- 散布液調製時および散布の際は、農薬用マスク、不浸透性手袋、ゴム長靴、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- 誤食などのないように注意し、誤って飲み込んだ場合は吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
使用中に異常を感じた時は、直ちに医師の手当を受けてください。
- 眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください(刺激性)。
- 皮ふに付着しないように注意してください。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落してください(刺激性)。
- 使用した散布器具は水で十分に洗ってください。
- 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。

包装：100g×60

●ラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。

販売

丸和バイオケミカル株式会社

本社：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 ☎03(5296)2314
札幌 ☎011(222)1285 仙台 ☎022(261)1103 名古屋 ☎052(951)7234
大阪 ☎06(6371)3145 福岡 ☎092(714)7101

輸入販売元

デュポン株式会社

本社：〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1アルコタワー ☎03(5434)6117

お求めは……

03-08-1TC