

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 18136 号

登 録 年 月 日 平 成 28 年 6 月 8 日

登 録 の 有 効 期 間 平 成 31 年 6 月 7 日

農 薬 の 種 類 ダイアジノン乳剤

農 薬 の 名 称 アグロスダイアジノン乳剤40

物 理 的 化 学 的 性 状 淡黄色澄明可乳化油状液体

有 効 成 分 の 種 類 及 び 含 有 量 (2-イソプロピル-4-メチル-6-ジエチルホスフェート) 40.0%

そ の 他 の 成 分 の 種 類 及 び 含 有 量 有機溶剤、界面活性剤等 60.0%

適 用 病 害 虫 の 範 囲 及 び 使 用 方 法 (別記のとおり)

製 造 者 又 は 輸 入 者 の 氏 名 及 び 住 所 東京都中央区新川二丁目27番1号
住友化学株式会社
社長 十倉 雅和


製 造 場 の 名 称 及 び 所 在 地 広島県庄原市川北町123
住化アグロ製造(株)庄原工場

農薬取締法第6条の2第2項の規定に基づき 平成28年12月14日 付けをもって上記のとおり
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

平成28年12月14日

農林水産大臣

山 本 有



(別記)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイズンを含む農薬の総使用回数				
キャベツ	アオシ コガ アブラムシ類	1000倍	100~300 Q/10a	収穫30日前まで	2回 以内	散布	2回以内				
	キスジノミハムシ	1200倍									
ブロッコリー カリフラワー	アオシ コガ アブラムシ類	1000倍						収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内 (粒剤の生育期の処理は 1回以内)
	キスジノミハムシ	1200倍									
	ホシマルヒメムシ	700倍									
ほうれんそう	アブラムシ類	1000倍						収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内 (は種時及びは種前の 土壌混和は合計1回以内)
ねぎ わけぎ	アブラムシ類 袴コガ	700~1200倍									
	アザシカ類										
	袴ハモグリハエ クマ袴ハエ										
あさつき	アブラムシ類 袴コガ	1000倍		収穫30日前まで			2回以内	散布	2回以内		
	アザシカ類	700~1200倍									
	袴ハモグリハエ クマ袴ハエ										
たまねぎ	アブラムシ類	1000倍		収穫21日前まで			2回以内	散布	2回以内		
	アザシカ類	700~1200倍									
	袴ハモグリハエ クマ袴ハエ										
なす (露地栽培)	アブラムシ類 テントウムシガマン	1000倍		収穫開始 3日前まで			3回 以内	散布	3回以内 (粒剤の生育期の処理は 2回以内)		
	ハダニ類	1000~2000倍									
ばれいしょ	アブラムシ類 テントウムシガマン	1000倍		収穫7日前まで			3回 以内	散布	3回以内 (植付前の土壌混和は 1回以内)		
さやいんげん	アブラムシ類	1000~2000倍		収穫開始 7日前まで					3回以内 (種子粉衣は1回以内、 粒剤は2回以内)		
	ハダニ類			6回以内 (種子粉衣は1回以内、 粒剤は2回以内、 乳剤は3回以内)							
さやえんどう 実えんどう	アブラムシ類	1000倍	収穫開始 14日前まで	4回 以内	散布	4回以内 (粒剤の生育期の処理は 3回以内)					
	ハダニ類	1000~2000倍	1回			2回以内					
すいか メロン	アブラムシ類	1000倍	収穫14日前まで	4回 以内	散布	4回以内 (粒剤の生育期の処理は 3回以内)					
	ハダニ類	1000~2000倍									
	ホシマルヒメムシ	700倍									
きゅうり	アブラムシ類	1000倍	植付時	1回	散布	2回以内					
	ハダニ類	1000~2000倍									
芝	コガシムシ類幼虫	800倍	3 Q/m ²	発生初期	4回 以内	散布	4回以内				
	シバツカ スジキヨウ	1000倍	0.3~1 Q/m ²								
	シバオサザウシ	0.3~0.5 Q/m ²									