



農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 8086 号

登 録 年 月 日 平 成 30 年 3 月 10 日

登 録 の 有 効 期 間 -

農 薬 の 種 類 有 機 銅 水 和 剤

農 薬 の 名 称 キ ノ ン ド ー 水 和 剤 4 0

物 理 的 化 学 的 性 状 黄 緑 色 粉 末

有 効 成 分 の 種 類 及 び 含 有 量 8-ヒドキシキノリン銅 40.0%

そ の 他 の 成 分 の 種 類 及 び 含 有 量 湿 展 剤 等 60.0%

適 用 病 害 虫 の 範 圍 及 び 使 用 方 法 (別 記 の と お り)


製 造 者 又 は 輸 入 者 の 氏 名 及 び 住 所 東 京 都 港 区 赤 坂 四 丁 目 2 番 1 9 号 ア グ ロ カ ネ シ ョ ウ 株 式 会 社 代 表 取 締 役 櫛 引 博 敬

製 造 場 の 名 称 及 び 所 在 地 新 潟 県 上 越 市 福 田 町 1 ア グ ロ カ ネ シ ョ ウ 株 式 会 社 直 江 津 工 場

農 薬 取 締 法 第 7 条 第 7 項 の 規 定 に 基 づ き 平 成 31 年 4 月 10 日 付 け を も っ て 上 記 の と お り 変 更 の 登 録 を し た の で 本 票 を 書 替 交 付 す る。

平 成 31 年 4 月 10 日

農 林 水 産 大 臣 吉 川 貴 盛



(別 記)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数又は 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	有機銅 を含む 農薬の 総使用回数					
りんご	黒星病	500～800倍	200～700 Q/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	7回以内 (塗布は3回以内、 散布は4回以内)					
	斑点落葉病 黒点病						8回以内 (塗布は3回以内、 散布は5回以内)					
かき	炭疽病	500倍		収穫3日前まで	9回以内		12回以内 (塗布は3回以内、 散布は9回以内)					
	うどんこ病 落葉病						8回以内 (塗布は3回以内、 散布は5回以内)					
なし	黒斑病	800～1000倍		200～700 Q/10a	発芽前～ 開花直前まで 但し、 収穫60日前まで		5回以内	8回以内 (塗布は3回以内、 散布は5回以内)				
	黒星病 輪紋病	600～800倍						5回以内				
もも	縮葉病	500～800倍		200～700 Q/10a	発芽前～ 開花直前まで 但し、 収穫60日前まで		5回以内	5回以内				
ネクタリン		700～800倍						5回以内				
みかん	黒点病	400～500倍		100～300 Q/10a	収穫30日前まで		4回以内 (開花後は 1回)	散布	7回以内 (塗布は3回以内、 散布は4回以内 (但し、開花後は 1回以内))			
	そうか病 黄斑病	500倍							3回以内			
ぶどう	べと病 枝膨病	600倍	100～300 Q/10a		収穫45日前まで	4回以内 (開花後は 1回)	散布		3回以内			
	黒とう病	600～800倍							5回以内			
ホップ	べと病	600倍	100～300 Q/10a		収穫10日前まで	5回以内			散布	5回以内		
	べと病 炭疽病	800～1000倍								3回以内		
メロン	斑点細菌病	600～800倍	100～300 Q/10a		収穫7日前まで	3回以内				散布	3回以内	
	果実汚斑細菌病	800倍									5回以内	
すいか	べと病 炭疽病	800～1000倍	100～300 Q/10a		収穫30日前まで	5回以内					散布	5回以内
	果実汚斑細菌病	800倍										8回以内
かぼちゃ	べと病 炭疽病	800～1000倍	100～300 Q/10a	収穫21日前まで	5回以内	散布		5回以内				
	軟腐病	800倍						8回以内				
はくさい	腐敗病	600～800倍	100～300 Q/10a	収穫14日前まで	3回以内		散布	3回以内				
	斑点細菌病 軟腐病 べと病	600倍						5回以内				
やまのいも	葉渋病	500～600倍	100～300 Q/10a	収穫30日前まで	8回以内			散布	8回以内			
こんにやく	腐敗病 葉枯病								500～600倍			3回以内
キャベツ	黒腐病	500～800倍	100～300 Q/10a	収穫14日前まで	3回以内				散布	3回以内		
ブロッコリー	黒腐病 黒斑細菌病	800倍								5回以内		
たまねぎ	軟腐病	600倍	100～300 Q/10a	収穫前日まで	5回以内					散布	5回以内	
きゅうり	斑点細菌病	600～800倍									4回以内	
	べと病 炭疽病	800～1000倍	株元 散布	4回以内								
しそ	斑点病	1000倍		株元 散布	4回以内							



作物名	適用病害虫名	希釈倍数又は 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	有機銅 を含む 農薬の 総使用回数
麦類 (小麦を除く)	雪腐病	200~400倍	100~200 Q/10a	根雪前	2回以内	散布	2回以内
小麦	斑葉病 なまぐさ黒穂病	10倍	—	は種前	1回	20分~1時間 種子浸漬	5回以内 (種子への処理は 1回以内)
		100倍				6~12時間 種子浸漬	
		乾燥種子 重量の0.5%				種子粉衣	
芝	雪腐病	100~200倍	0.5~1 Q/m ²	根雪前	3回以内	散布	5回以内
シクラメン	葉腐細菌病	5倍	2~5mQ/株		4回以内	葉柄基部 散布	
せんりょう	立枯病	1000倍	3 Q/m ²	発病初期	8回以内	灌注	8回以内
	炭疽病	800倍	100~500 Q/10a			散布	
まつ	葉ふるい病	500倍	200~700 Q/10a	生育期	4回以内		4回以内