

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量				
にんにく	一年生雑草	拵起前まで (雑草生育期)	200~500 _a /10a		1回	1回	1回		
ほうれんそう		収穫前日まで (雑草生育期: 畦間処理)						3回以内 2回以内	3回以内 2回以内
にんじん		拵起前又は は種前まで (雑草生育期)							
アサガオ	拵起前まで (雑草生育期)	1500~2000 _a /10a	1回	3回以内					
アサ	収穫前日まで (雑草生育期: 畦間処理)								
だいこん	一年生雑草	拵起前又は は種前まで (雑草生育期)	通常散布 50~100 g/10a		2回以内	2回以内	1回以内		
どーろ		収穫5日前まで (雑草生育期: 畦間処理)							
とうがらし類		拵起前まで (雑草生育期)							
なす	一年生雑草	拵起前まで (雑草生育期)	200~500 _a /10a	少量散布 25~50 g/10a	3回以内	3回以内	3回以内		
きゅうり		拵起前まで (雑草生育期)							
トマト		収穫前日まで (雑草生育期: 畦間処理)							
しなぐやく(薬用)	一年生雑草	拵起前まで (雑草生育期)	1回		1回	10回以内 (1年間に 2回以内)	2回以内		
薬用にんじん									
アブ(薬)	多年生雑草	収穫21日前まで (雑草生育期)	500~1000 _a /10a		3回以内	3回以内	2回以内		
びわ(薬)	アブ		1500 _a /10a		1回	3回以内	2回以内		
	アサガオ		500~1500 _a /10a		1回	3回以内	2回以内		
	一年生雑草	拵起前まで (雑草生育期)	200~500 _a /10a		1回	3回以内	2回以内		
いも類 (かんしょを除く)	多年生雑草	拵起前まで (雑草生育期)	500~1000 _a /10a		3回以内	3回以内	4回以内		
	アブ		1500~2000 _a /10a		1回	1回	4回以内		
	アサガオ		500~1500 _a /10a		1回	1回	4回以内		

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
かんしょ	一年生雑草	拵起前又は 播種前まで (雑草生育期)	拵起前又は 播種前まで (雑草生育期: 畦間処理)	200~500 g/10a	通常散布 50~100 g/10a	2回以内	2回以内	
茶		拵起前又は 播種前まで (雑草生育期)						
茶		拵起前又は 播種前まで (雑草生育期)						
さとうきび	一年生及び 多年生雑草	拵起前又は 播種前まで (雑草生育期: 畦間処理)	収穫60日前まで (雑草生育期: 畦間処理) (但し、仮茎長 1.5a以上)	500~1000 g/10a	少量散布 25~50 g/10a	2回以内	4回以内	
	園場内の 間株部	一年生雑草						200~500 g/10a
牧草	牧野、草地 (更新・造成)	一年生及び 多年生雑草	拵起前まで (雑草生育期) 拵起後後~ は種前まで (雑草発生抑制)	200~500 g/10a	少量散布 25~50 g/10a	3回以内	雑草茎葉散布 3回以内	
飼料用とう もろこし	一年生及び 多年生雑草	拵起前又は 播種前まで (雑草生育期)	最終刈取後: 雑草生育期 (草丈50cm以下)	500~1000 g/10a	50~100 g/10a	3回以内	2回以内	
飼料用さ とうきび	一年生雑草 多年生雑草	拵起前又は 播種前まで (雑草生育期)		500~1000 g/10a		4回以内	4回以内	
アサ	一年生雑草	拵起前又は 播種前まで (雑草生育期)		200~500 g/10a	通常散布 50~100 g/10a	2回以内	2回以内	
花き類・ 観葉植物 (きくを除く)	一年生雑草	拵起前まで (雑草生育期)	雑草生育期 畦間処理	500~1000 g/10a	少量散布 25~50 g/10a	4回以内	4回以内	
きく	一年生雑草	拵起前まで (雑草生育期)		500~1000 g/10a		4回以内	4回以内	
樹木類	アブ	雑草生育期		1500~2000 g/10a		4回以内	4回以内	
	アサガオ			500~1500 g/10a		4回以内	4回以内	

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用回数	使用方法	グリホサート を含む 農薬の 総使用回数
				葉量	蓄積水量			
林木	林地、造林地 (地ごしらえ)	スサ、ワヅ、 ワヅ等の 多年生雑草 雑かん木	生育期	1000~2000g/10a	30g/10a	3回 以内	雑草木・ 茎葉散布	3回以内
まつ (下刈り)		一年生及び 多年生雑草	発芽前又は 夏切後発芽前 (雑草生育期)	200~500g/10a	少量散布 25~50 g/10a	4回 以内	雑草 茎葉散布	4回以内
樹木等	公園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等	一年生雑草	雑草生育期	500~1000g/10a	通常散布 50~100 g/10a	3回 以内	植栽地を 除く 樹木等の 周辺地に 雑草木 茎葉散布	3回以内
		多年生雑草			少量散布 25~50 g/10a			
		一年生及び 多年生雑草			少量散布 5~25 g/10a			
		ワヅ			通常散布 50~100 g/10a			
		スサ ワヅ等の つる性 多年生雑草 竹類 雑かん木			少量散布 25~50 g/10a			

注入処理

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用量	本剤 の使用 回数	使用方法	グリホサート を含む 農薬の 総使用回数
林木	林地	スサ、ワヅ等の つる類	生育期	原液 又は 2倍液	つる径 使用量 (g/株) 2.0cm以下 0.5 2.1~3.0cm 1.0 3.1~4.0cm 1.5 4.1~5.0cm 2.0 5.1cm以上 3.0以上	3回以内	つる 注入処理	3回以内
		雑かん木 間伐する すぎ、ひのき	雑かん木、 間伐する すぎ、ひのき 生育期		1cm/株所、幹周7~8cm間隔 地上30cm直径 3所敷 10cm以下 2~3 10~15cm 4~6 16~20cm 7~9 20cm以上 10以上			
		ワヅ	ワヅ 生育期		1cm/株所、幹周7~8cm間隔 地上30cm直径 3所敷 10cm以下 2~3 10~20cm 4~8 20cm以上 10以上			
細作物	林地 放置竹林 畑地	竹類	夏~秋期	原液	5~10cm/本		竹類 注入処理	
	畑地	ワヅ	ワヅ 生育期		1cm/株所、幹周7~8cm間隔 地上30cm直径 3所敷 10cm以下 2~3 10~20cm 4~8 20cm以上 10以上		立木 注入処理	
樹木等	公園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等	雑かん木	雑かん木 生育期	原液 又は 2倍液	1cm/株所、幹周7~8cm間隔 地上30cm直径 3所敷 10cm以下 2~3 10~15cm 4~6 15~20cm 7~9 20cm以上 10以上	3回以内	つる 注入処理	3回以内
		スサ、ワヅ等の つる類	生育期		つる径 使用量 (g/株) 2.0cm以下 0.5 2.1~3.0cm 1.0 3.1~4.0cm 1.5 4.1~5.0cm 2.0 5.1cm以上 3.0以上			
		ワヅ	原液		1~2cm/株			

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グロリトを含む農薬の総使用回数	
				重量	希釈水量				
直播水稲		一年生雑草及び多年生広葉雑草	耕起前 (雑草生育期)	200~500 g/10a	通常散布 50~100 g/10a	1回 以内		2回以内	
		少量散布 5~50 g/10a							
		通常散布 50~100 g/10a			少量散布 25~50 g/10a				
		多年生 宿根雑草		500g/10a	少量散布 5~25 g/10a				
		一年生及び多年生雑草	耕起直後~ 出芽前 (雑草生育期) [乾田起栽培] は種30日前~ 出芽前 (雑草生育期) [乾田不耕起栽培]	200~500 g/10a	少量散布 25~50 g/10a				
麦類		一年生雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期)	500g/10a	少量散布 5~25 g/10a	3回 以内		3回以内	
		一年生雑草 及び 多年生 宿根雑草			通常散布 50~100 g/10a				
		は種後出芽前 (雑草生育期)			少量散布 25~50 g/10a				
	圃場内の 周縁部	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)	500g/10a	少量散布 5~25 g/10a				
雑穀類 (そば、とうもろこし を除く)		そば	耕起前又は は種前まで (雑草生育期)						
とうもろこし									とうもろこし 出芽前まで (雑草生育期)
豆類 (種実、ただし、だいず、 あずき、いんげんまめ、 らっかせいを除く)		一年生及び 多年生雑草	とうもろこし 出芽前まで (雑草生育期)	200~500 g/10a	通常散布 50~100 g/10a	少量散布 25~50 g/10a	2回 以内		2回以内
あずき いんげんまめ		一年生雑草	耕起前又は は種前まで (雑草生育期)						
			収穫5日前まで (雑草生育期: 畦間処理)						

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グロリトを含む農薬の総使用回数
				重量	希釈水量			
だいず		一年生雑草	耕起前又は 出芽前まで (雑草生育期)	200~500 g/10a	通常散布 50~100 g/10a	2回 以内		4回以内
			収穫前日まで (雑草生育期: 畦間処理)		通常散布 50~100 g/10a			
			収穫14日前まで (雑草生育期)		通常散布 50~100 g/10a			
えだまめ		一年生雑草	耕起前又は 出芽前まで (雑草生育期)	200~500 g/10a	通常散布 50~100 g/10a	3回 以内		3回以内
			収穫前日まで (雑草生育期: 畦間処理)		通常散布 50~100 g/10a			
野菜類 (えだまめ、はくさい、なす、 かぼちゃ、ピーマン、とうもろこし、 きゅうり、なす、びわ(葉)、 かぼ(葉)、しょうゆ、 しょうゆ、たらこのき、 薬用にんじんを除く)		一年生雑草	耕起前まで (雑草生育期)	200~500 g/10a	通常散布 50~100 g/10a	1回 以内		1回
			はくさい なす		通常散布 50~100 g/10a			
			はくさい なす		通常散布 50~100 g/10a			
ねぎ		一年生雑草	耕起前又は 定植5日前まで (雑草生育期)	200~500 g/10a	通常散布 50~100 g/10a	3回 以内		3回以内
			収穫30日前まで (雑草生育期: 定植後畦間処理)		通常散布 50~100 g/10a			
たまねぎ (播種栽培)		一年生雑草	耕起5日前まで (雑草生育期)	200~500 g/10a	通常散布 50~100 g/10a	3回 以内		3回以内
			収穫7日前まで (雑草生育期: 畦間処理)		通常散布 50~100 g/10a			
たまねぎ (収穫栽培)		一年生雑草	耕起又は 定植14日前まで (雑草生育期)	200~500 g/10a	通常散布 50~100 g/10a	3回 以内		3回以内
			耕起5日前まで (雑草生育期)		通常散布 50~100 g/10a			
			収穫7日前まで (雑草生育期: 畦間処理)					

農薬登録票

登録番号 第 21766 号 登録年月日 平成 27 年 9 月 6 日

登録の有効期間 平成 30 年 9 月 5 日

農薬の種類 グリホサートカリウム塩液剤

農薬の名称 ラウンドアップマックスロード

物理的・化学的性状 淡黄赤色透明水溶性液体

有効成分の種類及び含有量 グリホサート(塩)カリウム 46.0%

その他の成分の種類及び含有量 水、界面活性剤等 52.6%

適用病害虫の範囲及び使用方法 (S)空のとおり

製造者又は輸入者の氏名及び住所
 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 日産化学株式会社
 取締役社長 木下 小次郎


製造場の名称及び所在地
 山口県山陽小野田市大字小野田6903-1 日産化学工業小野田工場
 埼玉県児玉郡上里町大字神保原町宇西台235-1 日産化学工業南埼玉工場
 北海道釧路市北區PT9-23 北海道工業大学附属工場
 長野県上田市の工業団地 B-2040 日産化学工業上田工場

小分製造場 群馬県渋川市赤城町長井小川田6-5 小池化学株式会社工場

農薬取締法第6条の2第2項の規定に基づき変更の登録をしたので本票を替替交付する。 平成 30 年 2 月 14 日 付けをもって上記のとおり

平成 30 年 2 月 14 日

農林水産大臣 齋藤



(別記)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の施用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総施用回数
				薬量	希釈水量			
果樹類 (かんきつを除く)	-	一年生雑草 多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	200~500g/10a	通常散布 50~100 Q/10a	3回 以内	-	3回以内
		かんきつ		500~1000g/10a				
かんきつ	-	一年生雑草 多年生雑草	-	500~1500g/10a	少風散布 15~50 Q/10a	5回 以内	-	5回以内
		かんきつ		500~1500g/10a				
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草 及び 多年生 広葉雑草 一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)	500~1000g/10a	通常散布 50~100 Q/10a	3回 以内	-	3回以内
		多年生雑草		200~500g/10a				
水田作物 (水田刈畔)	水田刈畔	一年生雑草 多年生雑草	-	200~500g/10a	少風散布 25~50 Q/10a	1回	-	1回
		かんきつ		500~1000g/10a				
水田作物、畑作物 (休耕地)	休耕地	一年生雑草	雑草生育期	200~500g/10a	通常散布 50~100 Q/10a	5回 以内	-	5回以内
		多年生雑草		500~1000g/10a				
水田作物 (水稲を除く) 移植水稲	-	一年生雑草 及び 多年生 広葉雑草	耕耘前 (雑草生育期)	200~500g/10a	通常散布 50~100 Q/10a	2回 以内	-	2回以内
		多年生 (雑草)		500g/10a				
水田作物 (水稲を除く) 移植水稲	-	一年生雑草 及び 多年生 広葉雑草	-	200~500g/10a	通常散布 50~100 Q/10a	2回 以内	-	2回以内
		多年生 (雑草)		500g/10a				

使用処理

作物名	適用場所	適用殺草名	使用時期	希釈倍率	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	クワネートを含む農薬の総使用回数
牧草	牧野、草地	雑かん木	伐採直後	原液	切り口直徑 塗布量 5cm以下 2L 5~10cm 3~5L 10cm以上 10L以上	3回以内	切株 塗布処理	3回以内
樹木類	林地、荒地					4回以内		4回以内
日本芝(のしぼ)	-	一年生及び多年生雑草	雑草生育期	5~10倍	3~9 L/10a	3回以内	雑草 茎葉塗布	3回以内
樹木等	公園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 林道等	雑かん木	伐採直後	原液又は 2倍液	切り口全体に 十分量を塗布	-	植栽地を 除く 樹木等の 周辺地に 切株 塗布処理	-

登録の有効期間 平成33年9月5日
農薬取締法第2条第3項の規定に基づき
上記のとおり登録した。

平成30年8月23日
農林水産大臣

齋藤



製造者名称及び住所変更

日産化学工業株式会社 東京都千代田区神田錦町三丁目7番地1 を
日産化学株式会社 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 へ変更する

製造場名称変更

日産化学工業株式会社 小野田工場 を 日産化学株式会社 小野田工場 へ変更する
日産化学工業株式会社 埼玉工場 を 日産化学株式会社 埼玉工場 へ変更する

農薬取締法第6条第2項の規定に基づき 平成30年8月23日 付け
をもって上記のとおり変更の登録をしたので本票を替替交付する。

平成30年8月23日
農林水産大臣

齋藤



