葉から入って根まで枯らす

除草剤

GLYPHO-EX

グリホエキス®

液剤

農耕地登録品

農林水産省登録第18813号



■適用作物及び適用場所

野菜類・いも類・豆類
果樹類・雑穀類・麦類

水田作物（水田畦畔・水田刈跡）・移植水稲・直播水稲・水田作物、畑作物（休耕田）・茶・飼料用とうもろこし・牧草（牧野・草地）・つつじ類・樹木等（公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・宅地・のり面・鉄道等）・林木（造林地）
注入処理：林木（林地・放置竹林）

農耕地登録除草剤「グリホエキス液剤」は、安全性・使用方法・除草効果が実証済み!!

1. 葉から入って根まで枯らすので、枯れた雑草の再発生は無く、除草効果が長く続きます。
2. 土に落ちた散布液は、不活性化されるので除草後、苗の移植や種まきができます。
3. 水でうすめて雑草にまくだけなので、簡単に散布できます。

2ℓ　500mℓ　5ℓ　10ℓ　1ℓ　20ℓ　200ℓ

非選択性茎葉処理移行型
グリホサートイソプロピルアミン塩液剤

成分：グリホサートイソプロピルアミン塩
イソプロピルアンモニウム＝N－（ホスホノメチル）グリシナート…41.0%
水・界面活性剤等……59.0%
性状：黄色水溶性液体

使用時期・散布方法

- 雑草が生え揃った時期に、雑草全体がしっとり濡れる程度に散布して下さい。
  ※発芽抑制効果は無いので、雑草発生前は使用しないで下さい。
- 冬でも雑草の葉が緑色であれば、散布することができます。

希釈倍率表

水　量	1ℓ	4ℓ	18ℓ	50ℓ	100ℓ
100倍	10mℓ	40mℓ	180mℓ	500mℓ	1ℓ
50倍	20mℓ	80mℓ	360mℓ	1ℓ	2ℓ
25倍	40mℓ	160mℓ	720mℓ	2ℓ	4ℓ

グリホエキス® 液剤　作物名、適用場所および使用量　葉から入って根まで枯らす

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当たり使用量 薬量(mℓ)	10アール当たり使用量 希釈水量(ℓ)	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
果樹類（かんきつを除く）	―	一年生雑草	収穫7日前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）	250～500	通常散布 50～100	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		500～1,000				
かんきつ		一年生雑草		250～500	通常散布 50～100 少量散布 25～50			5回以内
		多年生雑草		500～1,000				
水田作物、畑作物（休耕田）	休耕田	一年生雑草	雑草生育期（草丈30cm以下）	250～500	50～100	2回以内		3回以内
		多年生雑草		500～1,000				
水田作物（水田畦畔）	水田畦畔	一年生雑草	収穫14日前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）	250～500				
		多年生雑草		500～1,000				
水田作物（水田刈跡）	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	250～500		1回		1回
		多年生雑草		500～1,000				
水田作物（水稲を除く）	―	一年生雑草	耕起20～10日前まで（雑草生育期）	250～500				2回以内
移植水稲								
直播水稲								
麦類（小麦を除く）			耕起7日前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）			3回以内		3回以内
小麦		多年生雑草	耕起7日前まで（雑草生育期）	500～750				
雑穀類		一年生雑草	耕起7日前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）	250～500	100	1回		2回以内
野菜類（だいこん、えだまめ、ねぎ、たまねぎ、トマト（ミニトマト）、なす、アスパラガス、オリーブ（葉）、しゃくやく（薬用）、たらのき、びわ（葉）、ほうれんそう、レタス、とうがらし類、にんじん、ビート、薬用にんじんを除く）								1回
とうがらし類								2回以内
にんじん								
ビート								
だいこん								
アスパラガス								3回以内
オリーブ（葉）								
しゃくやく（薬用）								
たらのき								
びわ（葉）								
ほうれんそう								
レタス								
トマト								
きゅうり								
なす								
薬用にんじん								10回以内（1年間に2回以内）
ねぎ			耕起7日前まで（雑草生育期）		少量散布 25～50	3回以内		3回以内
たまねぎ			耕起7日前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）		100			
			耕起又は定植7日前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）		少量散布 25～50			
えだまめ			耕起7日前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）		100			
豆類（種実、ただし、だいず、らっかせいを除く）			は種後出芽前（雑草生育期：草丈30cm以下）		少量散布 25～50	2回以内		2回以内
だいず			耕起前又はは種前まで（雑草生育期）					4回以内
			は種10日以前（雑草生育期）					
			は種後出芽前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）					
いも類（かんしょを除く）			耕起前又は植付前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）		100	1回		1回
かんしょ			耕起前（雑草生育期）					2回以内
茶			摘採7日前まで（雑草生育期）		少量散布 25～50			
さとうきび	圃場内の周縁部	多年生雑草	収穫30日前まで（雑草生育期）	500～1,000				6回以内
飼料用とうもろこし	―	一年生及び多年生雑草	耕起前又はは種前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）	250～500	50～100	2回以内		2回以内
			は種後出芽前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）					
牧草	牧野、草地（更新・造成）	一年生雑草	更新・造成の10日以前（雑草生育期）	500～1,000	50			3回以内
		多年生雑草						
		一年生及び多年生雑草	は種10日前～は種当日（耕起整地後）（雑草発生揃期）	250～500				
林木	造林地（地ごしらえ）	ススキ、ササ類等の多年生雑草	生育盛期以降（夏～秋期）	1,000	30	1回	雑草木茎葉散布	1回
		落葉雑かん木						
つつじ類	―	一年生雑草	雑草生育期（草丈30cm以下）	250～500	50～100	4回以内	雑草茎葉散布	4回以内
樹木等	公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・運動場・宅地・のり面・鉄道等	一年生雑草		500	100	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		1,000				
		スギナ	雑草生育期	2,000	50～100			

注入処理

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量 つる径(cm)	使用液量 使用量(mℓ/株)	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
林木	林地	クズ・フジ等のつる類	生育初期	原液又は2倍液	2以下	0.5	1回	つる注入処理	1回
					2.1～3.0	1.0			
					3.1～4.0	1.5			
					4.1～5.0	2.0			
					5.1以上	適宜増量			
	林地放置竹林	竹類	夏期	原液	5～10mℓ／本			竹稈注入処理	

お問い合せは
発売元
肥料・農薬等農業資材総合商社
赤城物産株式会社
東京都千代田区神田和泉町1番地1-7　東陽ビル2階
フリーアクセス 0120-973-697
ホームページ●http://www.akagi-bussan.co.jp