

農薬登録票

登録番号 第22584号 登録年月日 平成22年2月17日

登録の有効期間 平成25年2月16日

農薬の種類 アセタミプリド水溶剤
 農薬の名称 日農モスピラン顆粒水溶剤
 物理的・化学的性状 青色水溶性細粒及び微粒
 有効成分の種類及び含有量 (E)-N¹-[(6-クロロ-3-ピリジリル)メチル]-N²-シアノ-N¹-メチルアセチアミジン 20.0%
 その他の成分の種類及び含有量 乳糖、色素、界面活性剤等 80.0%
 適用病害虫の範囲及び使用方法 (別記のとおり)


製造者又は輸入者の氏名及び住所 東京都中央区日本橋一丁目2番5号
 日本農業株式会社
 代表取締役社長 神山 洋一

製造場の名称及び所在地 富山県高岡市向野本町300
 日本曹達(株)高岡工場
 群馬県高崎市大八木町888
 新富士化成薬(株)高崎工場

農薬取締法第6条の2第2項の規定に基づき 平成24年4月11日 付けをもって上記のとおり
 変更の登録をしたので本票を書替交付する。

平成24年4月11日

農林水産大臣 鹿野 道彦



(別記)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセタミプリドを含む農薬の総使用回数
かんきつ	アブラムシ類 シカハモグリガ アザミウマ類 カイガラムシ類 ゴマダカミキリ成虫 コアホムシ類 ケキスイ類 アゲハ類 カメムシ類 シカバエ	2000~4000倍	200~700 Q/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
	コナジラミ類	4000倍	30~75 Q/10a				
	ゴマダカミキリ	200~400倍					
りんご	アブラムシ類 キンモンホリガ キンモンホリガ シクイムシ類 カメムシ類 リンゴワムシ	2000~4000倍	200~700 Q/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	カイガラムシ類 モチョッキリウムシ	4000倍					
	ケムシ類	2000倍					
なし	カメムシ類 アブラムシ類 シクイムシ類 カイガラムシ類 キノヒメコバエ	2000~4000倍	200~700 Q/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
もも	アブラムシ類 モモモグリガ シクイムシ類 アザミウマ類 カメムシ類	2000倍					
ネクタリン	アブラムシ類 モモモグリガ シクイムシ類 アザミウマ類 カメムシ類	4000倍					
ぶどう	カイガラムシ類 アザミウマ類 フクセンヒメコバエ コガネムシ類成虫	2000~4000倍	200~700 Q/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
	ツマグロアリスカメ ブドウカミキリ	2000倍					
かき	アザミウマ類 カイガラムシ類 キノハタムシガ キノヒメコバエ カメムシ類	2000~4000倍	200~700 Q/10a	収穫後秋期	3回以内	散布	3回以内
小粒核果類 (うめ、すももを除く)	アブラムシ類 カイガラムシ類	2000倍					
うめ	アブラムシ類 ケキスイ類 ノコトガリキリガ カイガラムシ類	2000~6000倍 2000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセミプリドを含む農薬の総使用回数
すもも	カイガラムシ類	2000倍	200~700 Q/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	アブラムシ類	2000~4000倍					
おうとう	シクイムシ類	4000倍		収穫3日前まで	1回		1回
	カメムシ類 ウツボクサヨウバエ アザミヤカ類	2000~4000倍					
びわ	アブラムシ類 カキリムシ類	2000~4000倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内
	カイガラムシ類	2000倍					
いちじく	アザミヤカ類 ホシハミドリ カイガラムシ類 イチジクトリトキ	2000倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内
マンゴー	アザミヤカ類	2000~4000倍		収穫35日前まで	2回以内		2回以内
かりん	ナシメシキイ			収穫14日前まで			
キウイフルーツ	カイガラムシ類 オビハメコバエ	2000~4000倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内
	アブラムシ類	4000倍					
あけび(果実)	アブラムシ類	4000倍	収穫前日まで	1回	1回		
アセロラ	ウツボクサヨウバエ		収穫30日前まで	2回以内	2回以内		
ブルーベリー	カイガラムシ類	2000倍	収穫14日前まで	3回以内	3回以内		
パッションフルーツ	アブラムシ類	2000~4000倍	収穫前日まで				
とうもろこし (未成熟とうもろこしを除く)	アブラムシ類	2000~4000倍	100~300 Q/10a	収穫7日前まで	3回以内	4回以内(植付時の土壌混和は1回以内、植付後は3回以内)	
未成熟とうもろこし	テントウムシダマシ						
ばれいしょ	アブラムシ類	2000~6000倍	種芋掘取り7日前まで	5回以内	5回以内		
	アブラムシ類	4000倍					
やまのいも	アブラムシ類 アザミヤカ類	4000倍	収穫21日前まで	3回以内	3回以内		
やまのいも(種芋栽培)	アザミヤカ類		収穫45日前まで	6回以内	6回以内		
さんしょう(葉)	アザミヤカ類 アブラムシ類	200倍	20 Q/10a	収穫7日前まで	1回	樹幹散布	
さんしょう(果実)	コマダカキリ幼虫						
あずき	アブラムシ類	2000~4000倍	収穫14日前まで	3回以内	3回以内		
えだまめ	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミヤカ類	4000倍	収穫7日前まで				
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く)	アブラムシ類	2000~4000倍	100~300 Q/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	
さやいんげん	アブラムシ類	4000倍					
さやえんどう	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミヤカ類	4000倍	収穫前日まで	3回以内	3回以内		

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセミプリドを含む農薬の総使用回数		
きゅうり	コナジラミ類 ミカンキロアザミヤカ カリメイト	2000倍	100~300 Q/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	5回以内(2%粒剤の定植時の株元散布は1回以内、2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、散布、くん煙及び1%粒剤の株元散布は合計3回以内)		
	アブラムシ類 ミカンキロアザミヤカ	2000~4000倍							
すいか	アブラムシ類 アザミヤカ類 カリメイト コナジラミ類	2000倍		収穫3日前まで	3回以内		3回以内	4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内)	
	アブラムシ類	2000~4000倍							
メロン	アブラムシ類	8000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内	3回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回以内)	
トマト ミニトマト	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミヤカ類	2000倍							
なす	アブラムシ類 コナジラミ類	4000倍 2000倍		2000~4000倍	収穫前日まで		2回以内	2回以内	6回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計5回以内)
	アブラムシ類	2000~4000倍							
ピーマン	アブラムシ類 アザミヤカ類 コナジラミ類	4000倍		収穫7日前まで	5回以内		5回以内		
とうがらし類	アブラムシ類	8000倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内	4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)	
キャベツ	コナジラミ類 アブラムシ類	1000~2000倍 2000~4000倍							
ブロッコリー	コナジラミ類 アブラムシ類	2000倍	収穫14日前まで	3回以内	3回以内	1回			
はくさい	コナジラミ類 アブラムシ類	1000~2000倍 2000~4000倍							
だいこん	コナジラミ類 アブラムシ類 アザミヤカ類 ダクシカハムシ	2000倍 2000~4000倍 4000倍	2000~4000倍	収穫7日前まで	1回	1回	1回		
	アブラムシ類	2000倍							
わさびだいこん	コナジラミ類	2000~4000倍	2000~4000倍	収穫21日前まで	1回	1回			
はつかだいこん	アブラムシ類	2000倍							
かぶ	アブラムシ類 コナジラミ類 カブハムシ	4000倍	収穫7日前まで	2回以内	2回以内	3回以内(粒剤の株元散布及び土壌混和は合計1回以内、散布及びくん煙は合計2回以内)			
非結球あぶらな科葉菜類	アブラムシ類 アザミヤカ類	2000~4000倍							
いちご	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミヤカ類	2000倍	収穫前日まで	2回以内	2回以内				

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセミプリドを含む農薬の総使用回数			
つるな レモンパーム セージ バジル はっか パセリ 茎ブロッコリー メキャベツ 非結球メキャベツ 食用さくら(葉) たまねぎ	アブラムシ類	4000~8000倍	100~300 Q/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内			
収穫21日前まで										
収穫7日前まで										
収穫3日前まで		1回								
収穫前日まで		2回以内								
収穫7日前まで		1回								
収穫3日前まで		2回以内								
収穫3日前まで		1回								
ねぎ		アザミヤカ類		2000倍				収穫7日前まで	3回以内	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、植付時の土壌混和及び定植当日までの株元散布は合計1回以内)
わけぎ あさつき		アブラムシ類 コジラミ類 アザミヤカ類 ジュウシホシヒガハムシ		4000倍				収穫前日まで	2回以内	2回以内
アスパラガス				4000倍				収穫前日まで	2回以内	2回以内
レタス	アブラムシ類	2000~4000倍	収穫7日前まで	3回以内	4回以内(粒剤の株元散布は1回以内、散布は3回以内)					
非結球レタス	アブラムシ類 アザミヤカ類	4000倍	収穫7日前まで	1回	2回以内(粒剤の株元散布は1回以内、散布は1回以内)					
オクラ	アブラムシ類	2000倍	収穫前日まで	3回以内	3回以内					
食用ぎく	アブラムシ類 アザミヤカ類		収穫14日前まで	2回以内	2回以内					
食用ゆり	アブラムシ類		4回以内							
にら	アブラムシ類 アザミヤカ類	4000倍	収穫前日まで	3回以内	3回以内					
てんさい	テンサイヒハムシ テンサイモリハバエ	200倍	1冊当たり1Q (3Q/m ²)	定植前	1回	苗床 灌注	1回			
にがうり タイム マジョラム オレガノ	アブラムシ類	4000倍	100~300 Q/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内			
タイム		8000倍		収穫21日前まで						
マジョラム		8000倍		収穫14日前まで						
オレガノ		8000倍		収穫7日前まで						
茶	チャノミドリヒメコハ チャノキイロアザミヤカ チャノカガ	2000~4000倍	200~400 Q/10a	摘採14日前まで	1回	散布	1回			
みつば	アブラムシ類	8000倍	100~300 Q/10a	収穫7日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで	1回	散布	1回			

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセミプリドを含む農薬の総使用回数			
かぼちゃ	アブラムシ類	2000~4000倍	100~300 Q/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内(は種時または定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)			
ほうれんそう		8000倍		収穫14日前まで				2回以内		
カリフラワー	アブラムシ類 コガ アムシ	2000倍		収穫7日前まで				3回以内		
しよくようほおずき くきちしゃ ふだんそう しそ	アブラムシ類	4000倍		収穫14日前まで 収穫7日前まで				2回以内	2回以内	
ふき	コジラミ類	3000倍		収穫14日前まで						
らっきょう しゅんぎく なずな ははこぐさ エンサイ チャービル タラゴン ディル(葉) ソルガム まめ科牧草 飼料用とうもろこし いね科牧草 アマランサス(莖葉) ヤングコーン	アザミヤカ類	2000倍		収穫7日前まで				3回以内 2回以内 1回	3回以内 2回以内 1回	
セルリー	アブラムシ類	4000倍		収穫21日前まで 収穫14日前まで 収穫21日前まで 収穫45日前まで 収穫90日前まで				3回以内 2回以内 3回以内	3回以内 2回以内 2回以内	
たばこ		2000~4000倍		25~180 Q/10a				収穫10日前まで	2回以内	2回以内(定植時の土壌混和は1回以内)
花き類・観葉植物(きく、ストックを除く)	アザミヤカ類	4000倍		100~300 Q/10a				発生初期	5回以内	5回以内(但し定植後は2回以内)
ストック	アブラムシ類	2000倍								
きく	アブラムシ類 アザミヤカ類	2000~4000倍 4000倍 2000倍								
つつじ類 まつ やなぎ	ツツジガハ アブラムシ類 ヤギコハガリ	4000倍 2000~4000倍	200~700 Q/10a	3回以内	5回以内 5回以内(樹幹注入は1回以内)					